



SMBG diyabet takip programında kilit noktada yer almaktadır

“ İnsülin ve/veya oral antidiyabetik ajan kullanan bütün hastalar SMBG kullanımından yarar görebilirler ”

American Association of Diabetes Educators¹

“ SMBG hastaları glisemik kontrol, farkındalık ve kendine güvenin gelişmesi açısından cesaretlendirir ve onlara daha çok sorumluluk verir ”

American Diabetes Association²

“SMBG T2DM teşhisi yeni konulmuş bütün hastalarda, kendi kendini kontrol için kullanılmalıdır”

International Diabetes Federation³

1. AADE. Diabetes Educ 2006;32:835–6, 844–7.


2. ADA. Diabetes Care 1996;19(Suppl 1):S62–6.

3. IDF. <http://www.idf.org/home/index.cfm?unode=B7462CCB-3A4C-472C-80E4-710074D74AD3>



Kan şekeri düzeylerinin kontrolü, HbA_{1c} düzeylerini ve genel glisemik kontrolü iyileştirir


DCCT: Yoğun diyabet tedavisi HbA_{1c} düzeylerini geleneksel tedaviye göre daha fazla düşürür (p<0.001)





SMBG T2DM'da tedavi şekli ne olursa olsun, glisemik kontrolü artırır


Daha önceden SMBG kullanmayan hastalarda, günde bir kez SMBG uygulaması bütün tedavi gruplarında HbA_{1c} düzeylerini belirgin şekilde azaltmıştır (p<0.0001)





SMBG, T2DM'da fatal ve non-fatal komplikasyonları engeller


SMBG non-fatal komplikasyonları %32 oranında azaltmaktadır





SMBG diyabet bakımında ucuz bir yöntemdir

8 sene boyunca, diyabetli bir hastanın €29,258 olan maliyetinin sadece €402'su SMBG için harcanmıştır





SMBG tam bir diyabet bakım programının kilit bileşenidir

